

## Písomná informácia pre používateľa

### **Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety**

pazopanib

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Pazopanib Teva a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pazopanib Teva
3. Ako užívať Pazopanib Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Pazopanib Teva
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### **1. Čo je Pazopanib Teva a na čo sa používa**

Pazopanib Teva je typ lieku nazývaný *inhibítorm proteínnikáz*. Účinkuje tak, že bráni aktivite proteínov, ktoré sa zúčastňujú na raste a šírení rakovinových buniek.

Pazopanib Teva sa používa u dospelých na liečbu:

- rakoviny obličky, ktorá je v pokročilom štádiu alebo sa rozšírila do ďalších orgánov.
- niektorých foriem sarkómu mäkkých tkániv, čo je typ rakoviny, ktorá postihuje podporné tkanivá tela. Môže sa objaviť vo svaloch, krvných cievach, tukovom tkanive alebo v ďalších tkanivách, ktoré podporujú, obklopujú alebo chránia orgány.

### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pazopanib Teva**

**Neužívajte Pazopanib Teva**

- ak ste alergický na pazopanib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

**Porad'te sa s lekárom**, ak si myslíte, že sa vás to týka.

**Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Pazopanib Teva, obráťte sa na svojho lekára:

- ak máte **srdcové ochorenie**.
- ak máte **ochorenie pečeňe**.
- ak ste mali **srdcové zlyhanie alebo srdcový záchvat**.
- ak ste v minulosti prekonali **kolaps plúc**.
- ak ste mali problémy s **krvácaním, krvnými zrazeninami alebo zúžením tepien**.
- ak ste mali **problémy so žaludkom alebo črevami**, ako napríklad *perforácia* (prederavenie) alebo *fistula* (neobvyklé prechody vytvorené medzi časťami čreva).

- ak máte **problémy so štítou žľazou**.
- ak máte problémy s **činnosťou obličiek**.
- ak máte alebo ste mali **aneuryzmu** (zväčšenie a oslabenie steny krvnej ciev) alebo trhlinu v stene krvnej ciev.

Ak sa vás niektoré z uvedeného týka, **povedzte to svojmu lekárovi**. Váš lekár rozhodne, či je pre vás Pazopanib Teva vhodný. Môžete potrebovať **dodatačné vyšetrenia**, aby sa zistilo, či vám obličky, srdce a pečeň správne fungujú.

### **Vysoký krvný tlak a Pazopanib Teva**

Pazopanib Teva vám môže zvýšiť krvný tlak. Krvný tlak vám skontrolujú predtým, ako užijete Pazopanib Teva a budú vám ho kontrolovať aj počas jeho užívania. Ak budete mať vysoký krvný tlak, budete užívať lieky, ktoré ho znižujú.

Ak máte vysoký krvný tlak, **povedzte to svojmu lekárovi**.

### **Ak máte naplánovanú operáciu**

Váš lekár preruší vašu liečbu Pazopanibom Teva minimálne 7 dní pred operáciou, keďže Pazopanib Teva môže ovplyvniť hojenie rany. Vaša liečba sa znova začne, keď bude vaša rana dostatočne zahojená.

### **Zdravotné ťažkosti, na ktoré si budete musieť dávať pozor**

Pazopanib Teva môže zhoršiť niektoré zdravotné ťažkosti alebo môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Počas užívania Pazopanibu Teva si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby sa znížilo riziko vzniku akýchkoľvek problémov. **Pozri časť 4**.

### **Deti a dospevajúci**

Pazopanib Teva sa neodporúča pre osoby mladšie ako 18 rokov. Zatiaľ nie je známe, ako Pazopanib Teva účinkuje v tejto vekovej skupine. Okrem toho sa nemá používať u detí mladších ako 2 roky kvôli bezpečnostným obavám.

### **Iné lieky a Pazopanib Teva**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov rastlinného pôvodu a iných liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Niekteré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Pazopanib Teva účinkuje alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov. Pazopanib Teva môže taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré lieky. Medzi takéto lieky patria:

- klaritromycín, ketokonazol, itrakonazol, rifampicín, telitromycín, vorikonazol (používajú sa na **liečbu infekcií**).
- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir (používajú sa na **liečbu infekcie HIV**).
- nefazodón (používa sa na **liečbu depresie**).
- simvastatin a pravdepodobne aj iné statíny (používajú sa na **liečbu vysokých hladín cholesterolu**).
- lieky, ktoré **znižujú množstvo žalúdočnej kyseliny**. Typ lieku, ktorý užívate na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. inhibítorm protónovej pumpy, H<sub>2</sub> antagonist alebo antacidá), môže ovplyvniť spôsob, akým sa Pazopanib Teva užíva. Porad'te sa o tom, prosím, so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Ak užívate niektorý z uvedených liekov, **povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi**.

### **Pazopanib Teva a jedlo a nápoje**

**Pazopanib Teva neužívajte s jedlom**, keďže jedlo ovplyvňuje spôsob, akým sa tento liek vstrebáva. Užívajte ho aspoň dve hodiny po jedle alebo jednu hodinu pred jedlom (pozri časť 3).

Počas liečby Pazopanibom Teva **nepite grapefruitovú šťavu**, keďže môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov.

#### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

**Neodporúča sa užívať Pazopanib Teva ak ste tehotná.** Nie je známy účinok Pazopanibu Teva počas tehotenstva.

- **Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná** alebo ak plánujete otehotniť.
- Počas užívania a najmenej 2 týždne po užívaní Pazopanibu Teva **používajte spoločne antikoncepcie**, aby ste zabránili otehotneniu.
- **Ak počas liečby Pazopanibom Teva otehotniete**, povedzte to svojmu lekárovi.

**Počas užívania Pazopanibu Teva nedojčite.** Nie je známe, či zložky obsiahnuté v Pazopanibe Teva prechádzajú do materského mlieka. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

**Pacienti – muži** (vrátane tých, ktorí podstúpili vazektómiu), ktorí majú tehotné partnerky alebo partnerky, ktoré môžu otehotniť (vrátane tých, ktoré používajú iné metódy antikoncepcie), musia počas užívania Pazopanibu Teva a najmenej 2 týždne po poslednej dávke používať pri pohlavnom styku kondómy.

Liečba Pazopanibom Teva **môže ovplyvniť plodnosť**. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

#### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Pazopanib Teva môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

- Ak pocíťujete závraty, únavu alebo slabosť, alebo ak máte nedostatok energie, nevedzte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

#### **Pazopanib Teva obsahuje sodík**

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej filmom obalenej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

### **3. Ako užívať Pazopanib Teva**

**Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.** Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### **Odporučaná dávka**

##### Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety

**Zvyčajnou dávkou** sú štyri tablety Pazopanibu Teva 200 mg (800 mg pazopanibu) užívané jedenkrát denne. To je maximálna denná dávka. Váš lekár vám možno bude musieť znížiť dávku, ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky.

##### Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety

**Zvyčajnou dávkou** sú dve tablety Pazopanibu Teva 400 mg (800 mg pazopanibu) užívané jedenkrát denne. To je maximálna denná dávka. Váš lekár vám možno bude musieť znížiť dávku, ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky.

#### **Kedy liek užívať**

**Pazopanib Teva neužívajte s jedlom.** Užívajte ho aspoň dve hodiny po jedle alebo jednu hodinu pred jedlom.

Napríklad ho môžete užiť dve hodiny po raňajkách alebo jednu hodinu pred obedom. Pazopanib Teva užívajte každý deň v približne rovnakom čase.

Tablety prehltnite celé spolu s vodou, jednu po druhej. Tablety nelámte ani nedrvte, keďže to ovplyvňuje spôsob, akým sa tento liek vstrebáva a môže to zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov.

#### **Ak užijete viac Pazopanibu Teva, ako máte**

Ak užijete prveľa tablet, **porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom**. Ak je to možné, ukážte mu balenie lieku alebo túto písomnú informáciu.

#### **Ak zabudnete užiť Pazopanib Teva**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete v obvyklom čase.

#### **Neprestaňte užívať Pazopanib Teva bez rady**

Pazopanib Teva užívajte tak dlho, ako vám to odporučil váš lekár. Neprestaňte ho užívať, pokial vám to váš lekár neodporučí.

### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

#### **Možné závažné vedľajšie účinky**

##### **Opuch mozgu** (syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie)

Pazopanib Teva môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť opuch mozgu, ktorý môže ohrozovať život.

Príznaky zahŕňajú:

- stratu reči
- zmenu videnia
- záchvaty (kŕče)
- zmätenosť
- vysoký krvný tlak

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo ak sa u vás vyskytne bolesť hlavy sprevádzaná ktorýkoľvek z týchto príznakov, **prestaňte užívať Pazopanib Teva a ihned vyhľadajte lekársku pomoc.**

##### **Hypertenzná kríza (náhle a prudké zvýšenie krvného tlaku)**

Pazopanib Teva môže príležitostne spôsobiť náhle a prudké zvýšenie krvného tlaku, ktoré je známe ako hypertenzná kríza. Počas užívania Pazopanibu Teva vám bude váš lekár kontrolovať krvný tlak. Prejavy a príznaky hypertenznej krízy môžu zahŕňať:

- silnú bolesť na hrudníku
- silnú bolesť hlavy
- rozmazané videnie
- zmätenosť
- nevoľnosť
- vracanie
- pocit silnej úzkosti
- dýchavičnosť
- záchvaty (kŕče)
- mdloby

Ak pocítite nástup hypertenznej krízy, **prestaňte užívať Pazopanib Teva a ihned vyhľadajte lekársku pomoc.**

#### **Srdcové t'ažnosti**

Riziko týchto problémov môže byť vyššie u ľudí, ktorí už majú problémy so srdcom alebo užívajú ďalšie lieky. Počas užívania Pazopanibu Teva vás budú kontrolovať kvôli prípadným srdcovým t'ažnostiam.

### *Porucha funkcie srdca/srdcové zlyhávanie, srdcový infarkt*

Pazopanib Teva môže ovplyvniť výkon vášho srdca pri pumpovaní alebo môže zvýšiť riziko srdcového infarktu. Prejavy a príznaky zahŕňajú:

- nepravidelný alebo rýchly tep srdca
- rýchle búšenie srdca
- mdloby
- bolest' alebo tlak na hrudníku
- bolest' v ruke, v chrbte, v šíji alebo v čeľusti
- dýchavičnosť
- opuch nôh

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, **ihned vyhľadajte lekársku pomoc.**

### *Zmeny srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu)*

Pazopanib Teva môže narušiť srdcový rytmus, čo u niektorých ľudí môže vyvolať potenciálne závažné srdcové ťažkosti známe ako torsade de pointes. Tieto ťažkosti môžu mať za následok veľmi rýchly srdcový tep, ktorý spôsobí náhlu stratu vedomia.

Ak spozorujete akékoľvek **nezvyčajné zmeny srdcového tepu**, ako napríklad príliš rýchly alebo príliš pomalý srdcový tep, **povedzte to svojmu lekárovi.**

### **Mŕtvia**

Pazopanib Teva môže zvýšiť riziko mŕtvice. Prejavy a príznaky mŕtvice môžu zahŕňať:

- stípnutie alebo ochrnutie na jednej polovici tela
- ťažkosti s rozprávaním
- bolest' hlavy
- závraty

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, **ihned vyhľadajte lekársku pomoc.**

### **Krvácanie**

Pazopanib Teva môže spôsobiť závažné krvácanie v tráviacom trakte (napríklad v žalúdku, v pažeráku, z konečníka alebo v čreve) alebo v plúcach, v obličkách, v ústnej dutine, z pošvy a do mozgu, hoci je to menej časté. Príznaky zahŕňajú:

- krv v stolici alebo čiernu stolicu
- vylučovanie krvi močom
- bolest' žalúdka
- vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned vyhľadajte lekársku pomoc.**

### **Perforácia a fistula**

Pazopanib Teva môže spôsobiť prederavenie (perforáciu) steny vášho žalúdka alebo čreva, alebo zapríčiniť vznik neprirozeného spojenia medzi dvomi časťami vášho tráviaceho traktu (fistula).

Prejavy a príznaky môžu zahŕňať:

- silnú bolest' žalúdka
- nevoľnosť a/alebo vracanie
- horúčku
- vznik dier (perforácia) v žalúdku, tenkom alebo hrubom čreve, z ktorých sa uvoľňuje krvavý alebo zapáchajúci hnís

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned vyhľadajte lekársku pomoc.**

### **Problémy s pečeňou**

Pazopanib Teva môže spôsobiť problémy s pečeňou, ktoré môžu viesť k rozvoju závažných ochorení, ako je porucha funkcie pečene a zlyhanie pečene, ktoré môžu byť smrteľné. Počas užívania

Pazopanibu Teva vám bude váš lekár kontrolovať pečeňové enzymy. Prejavy naznačujúce možné poruchy funkcie pečene môžu zahŕňať:

- zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka)

- tmavý moč
- únavu
- nevoľnosť
- vracanie
- stratu chuti do jedla
- bolest' na pravej strane brucha (abdomenu)
- ľahko vznikajúce modriny

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned' vyhľadajte lekársku pomoc.**

### Krvné zrazeniny

#### *Hlboká žilová trombóza a plúcna embólia*

Pazopanib Teva môže spôsobiť krvné zrazeniny vo vašich žilách, najmä v nohách (hlboká žilová trombóza), ktoré sa môžu presunúť aj do plúc (plúcna embólia). Prejavy a príznaky môžu zahŕňať:

- ostrú bolest' na hrudníku
- dýchavičnosť
- zrýchlený dych
- bolest' nôh
- opuch rúk a dlaní alebo nôh a chodidiel

#### *Trombotická mikroangiopatia*

Pazopanib Teva môže spôsobiť krvné zrazeniny v malých cievach obličiek alebo mozgu spojených s poklesom počtu červených krviniek a buniek zúčastňujúcich sa na zrážaní krvi (trombotická mikroangiopatia). Prejavy a príznaky môžu zahŕňať:

- ľahko vznikajúce modriny
- vysoký krvný tlak
- horúčka
- zmätenosť
- ospalosť
- záchvaty (kŕče)
- znížený objem moču

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned' vyhľadajte lekársku pomoc.**

### Syndróm z rozpadu nádoru

Pazopanib Teva môže spôsobiť rýchly rozpad rakovinových buniek a následný syndróm z rozpadu nádoru, ktorý môže byť u niektorých ľudí smrteľný. Príznaky môžu zahŕňať nepravidelný srdcový rytmus, záchvaty (kŕče), zmätenosť, svalové kŕče alebo znížené vylučovanie moču.

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned' vyhľadajte lekársku pomoc.**

### Infekcie

Priebeh infekcie, ktorá sa u vás vyvinie počas liečby Pazopanibom Teva môže byť závažný. Príznaky infekcie môžu zahŕňať:

- horúčku
- príznaky podobné chrípke, ako je kašeľ, únava a pretrvávajúca bolest' celého tela
- dýchavičnosť a/alebo sipot
- bolest' pri močení
- rezné rany, odreniny alebo rany, ktoré sú začervenané, pálivé, opuchnuté alebo bolestivé

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned' vyhľadajte lekársku pomoc.**

### Zápal plúc

Pazopanib Teva môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť zápal plúc (intersticiálnu chorobu plúc, pneumonitídum), ktorý môže byť u niektorých ľudí smrteľný. Príznaky zahŕňajú dýchavičnosť alebo kašeľ, ktoré neustupujú. Počas užívania Pazopanibu Teva vás budú kontrolovať kvôli prípadným problémom s plúcami.

Ak sa u vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, **ihned' vyhľadajte lekársku pomoc.**

### **Problémy so štítnou žľazou**

Pazopanib Teva môže znížiť množstvo hormónu štítej žľazy, ktoré sa tvorí v tele. To môže viesť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a únavy. Počas užívania Pazopanibu Teva vám budú kontrolovať hladinu hormónov štítej žľazy.

Ak začnete príliš rýchlo priberať alebo budete pociťovať únavu, **povedzte to svojmu lekárovi**.

### **Rozmazané alebo zhoršené videnie**

Pazopanib Teva môže spôsobiť odlúpenie alebo natrhnutie výstelky zadnej časti oka (odlúpenie alebo natrhnutie sietnice). To môže viesť k rozmazanému alebo zhoršenému videniu.

Ak zaznamenáte akúkoľvek zmenu vo videní, **povedzte to svojmu lekárovi**.

### **Možné vedľajšie účinky (vrátane možných závažných vedľajších účinkov zoradených podľa kategórie frekvencie výskytu).**

#### **Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):**

- vysoký krvný tlak
- hnačka
- nevoľnosť alebo vracanie
- bolest žalúdka
- nechutenstvo (strata chuti do jedla)
- úbytok telesnej hmotnosti
- porucha vnímania chuti alebo strata vnímania chuti
- boľavé ústa
- bolest hlavy
- bolest v mieste nádoru
- nedostatok energie, slabosť alebo únava
- zmeny farby vlasov
- nezvyčajné vypadávanie vlasov alebo rednutie vlasov
- strata kožného pigmentu
- kožná vyrážka, ktorá môže zahrňať olupovanie kože
- začervenanie a opuch dlaní rúk alebo chodidiel nôh

Ak vám ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov začne robiť tŕažkosti, **povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi**.

#### **Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť pri krvných vyšetreniach alebo vyšetreniach moču:**

- zvýšenie hladín pečeňových enzýmov
- zníženie hladiny albumínu v krvi
- bielkoviny v moči
- zníženie počtu krvných doštičiek (bunky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi)
- zníženie počtu bielych krviniek

#### **Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):**

- tráviace tŕažkosti, nafukovanie, plynatosť
- krvácanie z nosa
- suchosť v ústach alebo vriedky v ústnej dutine
- infekcie
- nezvyčajná ospalosť
- tŕažkosti so spánkom
- bolest na hrudníku, dýchavičnosť, bolest nôh a opuch nôh/chodidiel. Môžu to byť prejavy krvnej zrazeniny v tele (tromboembólia). Ak sa krvná zrazenina odtrhne, môže sa dostať do pľúc a to môže ohroziť život alebo dokonca spôsobiť smrť.
- zníženie schopnosti srdca prečerpávať krv do celého tela (srdečná dysfunkcia)
- pomalý srdečný tep
- krvácanie v ústnej dutine, konečníku alebo pľúcach

- závraty
- rozmazané videnie
- návaly tepla
- opuch tváre, rúk, členkov, chodidel alebo očných viečok spôsobený nahromadením tekutiny
- mrväčenie, slabosť alebo necitlivosť v rukách, ramenách, nohách alebo chodidlách
- poruchy kože, začervenanie kože, svrbenie, suchosť kože
- poruchy nechtorov
- pocit pálenia, pichania, svrbenia alebo mrväčenia na koži
- pocit chladu spolu s triaškou
- nadmerné potenie
- odvodnenie organizmu (dehydratácia)
- bolest svalov, kĺbov, šliach alebo bolest na hrudníku, svalové kŕče
- zachrípnutie
- dýchavičnosť
- kašeľ
- vykašliavanie krvi
- štíkútka
- kolaps plúc s nahromadením vzduchu v priestore medzi plúcami a hrudníkom, ktoré často spôsobuje dýchavičnosť (pneumotorax)

Ak vám ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov začne robiť ťažkosti, **povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.**

**Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť pri krvných vyšetreniach alebo vyšetreniach moču:**

- nedostatočná činnosť štítnej žľazy
- porucha funkcie pečene
- zvýšenie množstva bilirubínu (látku tvorená v pečeni)
- zvýšenie množstva lipázy (enzým zúčastňujúci sa na trávení)
- zvýšenie množstva kreatinínu (látku tvorená vo svaloch)
- zmeny hladín iných rôznych chemických látok/enzýmov v krvi. Váš lekár vás bude informovať o výsledkoch krvných vyšetrení

**Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):**

- cievna mozgová príhoda (mítvica)
- prechodný pokles prísunu krvi do mozgu (prechodný ischemický atak)
- prerušenie prísunu krvi do časti srdca alebo srdcový záchvat (infarkt myokardu)
- čiastočné prerušenie prísunu krvi do časti srdca (ischémia myokardu)
- krvné zrazeniny sprevádzané poklesom počtu červených krviniek a krviniek, ktoré sa zúčastňujú na zrážaní krvi (trombotická mikroangiopatia). Krvné zrazeniny môžu poškodiť orgány, ako napríklad mozog a obličky.
- zvýšenie počtu červených krviniek
- náhla dýchavičnosť, ktorá je sprevádzaná ostrou bolesťou v hrudníku a/alebo rýchlym dýchaním (plúcna embólia)
- závažné krvácanie v tráviacom trakte (napríklad v žalúdku, v pažeráku alebo v čreve) alebo v obličkách, z pošvy a do mozgu
- poruchy srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu)
- prederavenie (perforácia) žalúdka alebo čreva
- neobvyklé prepojenia vytvorené medzi časťami čreva (fistula)
- silná alebo nepravidelná menštrúácia
- náhle prudké zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza)
- zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatída)
- zápal pečene, nedostatočná činnosť pečene alebo poškodenie pečene
- zožltnutie kože a očných bielok (žltáčka)
- zápal výstelky brušnej dutiny (peritonitída)
- nádcha

- vyrážky, ktoré môžu byť svrbivé alebo zapálené (ploché alebo vyvýšené škvrny alebo pluzgiere)
- častá stolica
- zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie
- znížené vnímanie dotyku alebo znížená citlivosť, najmä na koži
- kožná rana, ktorá sa nehojí (kožný vred)

**Zriedkavé vedľajšie účinky** (môžu postihovať **menej ako 1 z 1 000 osôb**):

- zápal plúc (pneumonitída)
- zväčšenie a oslabenie steny krvnej cievky alebo trhlina v stene krvnej cievky (aneuryzmy a arteriálne disekcie)

**Neznáme** (z dostupných údajov):

- syndróm z rozpadu nádoru spôsobený rýchlym rozpadom rakovinových buniek
- zlyhanie pečene

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, **obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika**. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [Prílohe V](#).

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## 5. Ako uchovávať Pazopanib Teva

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

**Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie**, ktorý je uvedený na fláši alebo blistri a na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo Pazopanib Teva obsahuje

*Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety:*

- Liečivo je pazopanib (vo forme hydrochloridu). Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg pazopanibu.
- Ďalšie zložky sú:  
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30 (E1201), stearát horečnatý (E470b).  
Obal tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 (E1521), červený oxid železitý (E 172), polysorbát 80 (E 433).

*Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety*

- Liečivo je pazopanib (vo forme hydrochloridu). Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg pazopanibu.
- Ďalšie zložky sú:  
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30 (E1201), stearát horečnatý (E470b).

Obal tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 (E1521), polysorbát 80 (E 433).

### Ako vyzerá Pazopanib Teva a obsah balenia

#### Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety:

Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety sú v tvare kapsuly, ružové, s označením „200“ na jednej strane, s rozmermi približne 14,3 mm x 5,7 mm.

Dodávajú sa v čírych/priehľadných hliníkových PVC/PE/PVDC blistroch po 30, 60, v multibaleniach po 60 (2 balenia po 30), 90, v multibaleniach po 90 (3 balenia po 30) tabliet.

#### Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety:

Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety sú v tvare kapsuly, biele, s označením „400“ na jednej strane, s rozmermi približne 18,0 mm x 7,1 mm.

Dodávajú sa v čírych/priehľadných hliníkových PVC/PE/PVDC blistroch po 30, 60, v multibaleniach po 60 (2 balenia po 30), 90, v multibaleniach po 90 (3 balenia po 30) tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

#### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko

#### Výrobca

Remedica Ltd Aharnon Street,Limassol Industrial Estate, Limassol 3056, Cyprus  
PharOS MT Ltd. HF62X, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta

### Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Bulharsko:	Pazopanib Teva 200 mg film-coated tablets Pazopanib Teva 400 mg film-coated tablets
Chorvátsko:	Pazopanib Teva 200 mg filmom obložene tablete Pazopanib Teva 400 mg filmom obložene tablete
Estónsko:	Pazopanib Teva
Litva:	Pazopanib Teva 200 mg plévele dengtos tabletės Pazopanib Teva 400 mg plévele dengtos tabletės
Lotyšsko:	Pazopanib Teva 200 mg apvalkotās tablets
Maďarsko:	Pazopanib Teva 200 mg filmtabletta Pazopanib Teva 400 mg filmtabletta
Rumunsko:	PAZOPANIB TEVA 200 mg, comprimate filmate PAZOPANIB TEVA 400 mg, comprimate filmate
Slovenská republika:	Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 02/2022.