

## Písomná informácia pre používateľa

### Abiraterone medac 250 mg tablety Abiraterone medac 500 mg filmom obalené tablety abiraterón-acetát

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Abiraterone medac a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Abiraterone medac
3. Ako užívať Abiraterone medac
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Abiraterone medac
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### 1. Čo je Abiraterone medac a na čo sa používa

Abiraterone medac obsahuje liečivo, ktoré sa volá abiraterón-acetát. Používa sa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela. Abiraterone medac zastavuje vo vašom tele tvorbu testosterónu, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty.

Ked' je Abiraterone medac predpísaný na skoré štádium ochorenia, ktoré ešte odpovedá na hormonálnu liečbu, používa sa s liečbou znižujúcou hladinu testosterónu (androgén-deprivačná liečba).

Ked' budete užívať tento liek, lekár vám predpíše aj ďalší liek, ktorý sa volá prednizón alebo prednizolón. Je to preto, aby sa zmenšilo riziko vzniku vysokého krvného tlaku, priveľkého množstva vody v organizme (zadržiavanie tekutín) alebo zníženej hladiny chemického prvkmu nazývaného draslík v krvi.

### 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Abiraterone medac

**Neužívajte Abiraterone medac**

- ak ste alergický na abiraterón-acetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste žena, hlavne ak ste tehotná. Abiraterone medac je určený len na použitie u mužov.
- ak máte ľažké poškodenie pečeňe.
- v kombinácii s Ra-223 (ktorý sa používa na liečbu rakoviny prostaty).

Neužívajte tento liek, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

**Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Abiraterone medac, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte ľažkosti s pečeňou

- ak vám povedali, že máte vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie alebo nízku hladinu draslíka v krvi (nízka hladina draslíka v krvi môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu)
- ak máte iné ťažkosti so srdcom alebo krvnými cievami
- ak máte nepravidelnú alebo rýchlu srdcovú frekvenciu
- ak ste dýchavičný
- ak ste rýchlo príbrali
- ak vám opúchajú chodidlá, členky alebo nohy
- ak ste v minulosti užívali liečivo ketokonazol na rakovinu prostaty
- ohľadom potreby užívať tento liek s prednizónom alebo prednizolónom
- ohľadom možných účinkov na vaše kosti
- ak máte vysokú hladinu cukru v krvi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak vám povedali, že máte akýkoľvek poruchy srdca alebo cievne ochorenia, vrátane porúch srdcového rytmu (arytmia) alebo užívate lieky na tieto ochorenia.

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte zožltnutie kože alebo očí, stmavnutie moču alebo závažnú nevolnosť alebo vracanie, pretože tieto môžu byť prejavmi alebo príznakmi problémov pečene. Zriedkavo sa môže vyskytnúť zlyhávanie funkcie pečene (nazývané akútne zlyhávanie pečene), ktoré môže viesť k úmrtiu.

Môže sa objaviť pokles počtu červených krvinek, zníženie sexuálnej túžby (libido), svalová slabosť a/alebo bolest' svalov.

Abiraterone medac sa nesmie podávať spolu s Ra-223 kvôli možnému zvýšeniu rizika kostných zlomenín alebo smrti.

Ak máte v pláne užívať Ra-223 po liečbe liekom Abiraterone medac a prednizónom/prednizolónom, musíte čakať 5 dní pred začatím liečby s Ra-223.

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

### Krvné testy

Abiraterone medac môže mať vplyv na pečeň, pričom možno nepocítite nijaké príznaky. Kým budete užívať tento liek, lekár vám bude pravidelne kontrolovať krvný obraz, aby odhalil akýkoľvek vplyv na pečeň.

### Deti a dospevajúci

Tento liek nie je určený na použitie u detí a dospevajúcich. Ak dieťa alebo dospevajúci náhodne užije Abiraterone medac, ihneď chodťte do nemocnice a zoberte so sebou písomnú informáciu pre používateľa, aby ste ju mohli ukázať lekárovi na pohotovosti.

### Iné lieky a Abiraterone medac

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete akýkoľvek liek.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase uživali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to dôležité, pretože Abiraterone medac môže zvyšovať účinky niektorých liekov, vrátane liekov na srdce, sedatív, niektorých liekov na cukrovku, rastlinných liekov (napr. ľubovník bodkovaný) a iných. Váš lekár môže zmeniť dávku týchto liekov. Niektoré lieky tiež môžu zvyšovať alebo znižovať účinky lieku Abiraterone medac. Môže to viesť k vedľajším účinkom alebo spôsobiť, že Abiraterone medac nebude fungovať ako by mal.

Androgén-deprivačná liečba môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate lieky

- používané na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, prokaínamid, amiodarón a sotalol);

- o ktorých je známe, že zvyšujú riziko porúch srdcového rytmu [napr. metadón (užívaný na úľavu od bolesti a ako súčasť odvykacej liečby), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká (užívané na liečbu závažných duševných porúch)].

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov.

### **Abiraterone medac a jedlo**

Tento liek sa nesmie užívať spolu s jedlom (pozri časť 3, „Užívanie tohto lieku“). Užívanie lieku Abiraterone medac spolu s jedlom môže vyvolávať vedľajšie účinky.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Abiraterone medac sa u žien nepoužíva. Tento liek môže uškodiť nenaistenému dieťaťu, ak ho užijú ženy, ktoré sú tehotné.

Ak pohlavne žijete so ženou, ktorá môže otehotniť, používajte kondóm a ďalšiu účinnú metódu na zabránenie otehotnenia.

Ak pohlavne žijete s tehotnou ženou, používajte kondóm, aby ste chránili nenaistené dieťa.

### **Abiraterone medac 250 mg tablety**

Tehotné ženy alebo tie, ktoré môžu byť tehotné, majú nosiť rukavice, ak je potrebné aby sa lieku Abiraterone medac dotýkali alebo s ním zaobchádzali.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Nie je pravdepodobné, že tento liek ovplyvní schopnosť viest' vozidlá a používať akékoľvek nástroje či obsluhovať stroje.

### **Abiraterone medac obsahuje laktózu a sodík**

- Abiraterone medac obsahuje laktózu (druh cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek tiež obsahuje približne 23,2 mg sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v dávke štyroch 250 mg tablet a 23 mg sodíka v dávke dvoch 500 mg tablet. To sa rovná 1,2 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

## **3. Ako užívať Abiraterone medac**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

### **Koľko lieku treba užiť**

Odporúčaná dávka je 1 000 mg (štyri tablety) raz denne.

Odporúčaná dávka je 1 000 mg (dve tablety) raz denne.

### **Užívanie tohto lieku**

- Tento liek užívajte cez ústa.
- **Neužívajte Abiraterone medac spolu s jedlom.**  
**Užite Abiraterone medac minimálne jednu hodinu pred alebo minimálne dve hodiny po jedle** (pozri časť 2, „Abiraterone medac a jedlo“).
- Tablety prehltnite celé a zapite vodou.
- Tablety nerozlamujte.
- Abiraterone medac sa užíva spolu s liekom, ktorý sa volá prednizón alebo prednizolón. Prednizón alebo prednizolón užívajte presne tak, ako vám povedal lekár.
- Musíte užívať prednizón alebo prednizolón každý deň, kým užívate Abiraterone medac.
- Množstvo prednizónu alebo prednizolónu, ktoré užívate, môže byť potrebné zmeniť v prípade naliehavého zdravotného stavu. Lekár vám oznámi, ak bude potrebné zmeniť množstvo prednizónu alebo prednizolónu, ktorý užívate. Neprestávajte užívať prednizón alebo prednizolón, pokial' vám tak nepovie váš lekár.

Lekár vám môže predpísat aj iné lieky, kým užívate Abiraterone medac a prednizón alebo prednizolón.

**Ak užijete viac lieku Abiraterone medac, ako máte**

Ak užijete viac, ako máte, ihned sa poraďte s lekárom alebo choďte do nemocnice.

**Ak zabudnete užiť Abiraterone medac**

Ak zabudnete užiť Abiraterone medac alebo prednizón či prednizolón, nasledujúci deň užite zvyčajnú dávku.

Ak zabudnete užiť Abiraterone medac alebo prednizón či prednizolón počas obdobia dlhšieho ako jeden deň, bezodkladne sa poraďte s lekárom.

**Ak prestanete užívať Abiraterone medac**

Neprestávajte užívať Abiraterone medac alebo prednizón či prednizolón, ak vám tak nepovedal váš lekár. Ak máte akokoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

#### 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

**Prestaňte užívať Abiraterone medac a ihned vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich príznakov:**

- Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búsenie srdca (palpitácie). Môžu to byť prejavy toho, že máte nízku hladinu draslíka v krvi.

**Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí:**

**Veľmi časté** (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

Tekutina v nohách alebo chodidlách, nízka hladina draslíka v krvi, zvýšené hodnoty testov funkcie pečene, vysoký krvný tlak, infekcia močových ciest, hnačka.

**Časté** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

Vysoká hladina tukov v krvi, bolesť v hrudníku, nepravidelný srdcový rytmus (atriálna fibrilácia), zlyhávanie srdca, rýchly pulz, závažné infekcie nazývané sepsa, zlomeniny kostí, porucha trávenia, krv v moči, vyrážka.

**Menej časté** (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Ťažkosti s nadobličkami (súvisiace s poruchou rovnováhy solí a vody), abnormálny srdcový rytmus (arytmia), svalová slabosť a/alebo bolesť svalov.

**Zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

Podráždenie plúc (nazývané tiež alergická alveolítida). Zlyhávanie funkcie pečene (tiež nazývané akútne zlyhávanie pečene).

**Neznáme** (z dostupných údajov):

Infarkt, zmeny na EKG – elektrokardiogramie (predĺženie QT intervalu) a závažné alergické reakcie s tŕažkosťami pri prehlitaní alebo dýchaní, opuchom tváre, pier, jazyka alebo hrdla, prípadne svrbivou výrāžkou.

U mužov, ktorí sa liečia na karcinóm prostaty, sa môže vyskytnúť úbytok kostnej hmoty. Abiraterone medac v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom môže zvýšiť úbytok kostnej hmoty.

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## 5. Ako uchovávať Abiraterone medac

- Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku fl'aše po EXP. Dátum exspirácie sa vztahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vztahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- 250 mg tablety: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
- 500 mg tablety: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
- Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo Abiraterone medac obsahuje

- Liečivo je abiraterón-acetát. Jedna tableta obsahuje 250 mg abiraterón-acetátu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy, stearát horečnatý, hypromelóza (typ 2910), koloidný bezvodý oxid kremičitý a laurylsíran sodný (pozri 2. časť „Abiraterone medac obsahuje laktózu a sodík“).
- Liečivo je abiraterón-acetát. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg abiraterón-acetátu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy, stearát horečnatý, hypromelóza (typ 2910), koloidný bezvodý oxid kremičitý a laurylsíran sodný (pozri 2. časť „Abiraterone medac obsahuje laktózu a sodík“). Filmový obal obsahuje čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), vrubľovaný kopolymér makrogolu a polyvinylalkoholu, mastenec a oxid titaničitý (E171).

### Ako vyzerá Abiraterone medac a obsah balenia

- Tablety Abiraterone medac sú biele až takmer biele, oválne, obojstranne vypuklé neobalené tablety s označením „250“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
- Tablety sa dodávajú v 100 ml HDPE fl'aši s detským bezpečnostným uzáverom s integrovaným vysúšadlom (polypropylén, PP). Jedna fl'aša obsahuje 120 tablet. Jedna škatuľa obsahuje jednu fl'ašu.
- Filmom obalené tablety Abiraterone medac sú fialové, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s označením „500“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
- Tablety sa dodávajú v blistroch, v kartónových škatuliach s obsahom 56 alebo 60 filmom obalených tablet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

medac  
Gesellschaft für klinische  
Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Nemecko  
Tel.: +49 (0)4103 8006-0  
Fax: +49 (0)4103 8006-100

### Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Dánsko, Česká republika | Abirateron medac                      |
| Nemecko                 | Abirateron medac 250 mg Tabletten     |
| Slovenská republika     | Abirateron medac 500 mg Filmtabletten |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Švédsko           | Abiraterone medac 500 mg filmom obalené tablety<br>Abiraterone medac 250 mg tabletter<br>Abiraterone medac 500 mg filmdragerad tabletter<br>Abiraterone medac |
| Taliansko, Nórsko |   |

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná 04/2022.**