

Písomná informácia pre používateľa

ACTAIR 100 IR sublingválne tablety

Na použitie u dospelých a dospelých (vo veku 12 – 65 rokov)

Štandardizované alergénové extrakty z roztočov domáceho prachu
(Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae)

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je ACTAIR a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACTAIR
3. Ako užívať ACTAIR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ACTAIR
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je ACTAIR a na čo sa používa

ACTAIR obsahuje alergénové extrakty z roztočov domáceho prachu.

ACTAIR sa používa na liečbu alergickej rinitídy (nádchy, zápalu nosovej sliznice) u dospelavajúcich (12 – 17 rokov) a dospelých. ACTAIR zvyšuje imunologickú znášanlivosť (schopnosť vášho tela bojovať) roztočov domáceho prachu. Liečbu bude možno potrebné užívať 3 mesiace, kým spozorujete akékoľvek zlepšenie.

ACTAIR 100 IR je určený len na obdobie zvyšovania dávky, nie na udržiavaciu liečbu.

Predtým, ako začnete s liečbou vám lekár diagnostikuje alergiu pomocou vhodných kožných a/alebo krvných vyšetrení.

Prvú dávku ACTAIRU musíte užiť pod dohľadom lekára. Lekár vás musí sledovať najmenej pol hodiny po užíti prvej dávky. Ide o preventívne opatrenie na sledovanie vašej citlivosti na liek. Zároveň budete mať možnosť porozprávať sa s lekárom o možných vedľajších účinkoch.

ACTAIR predpisujú lekári skúsení v liečbe alergií.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACTAIR

Neužívajte ACTAIR

- ak ste alergický na ktorúkoľvek z pomocných látok (ďalších zložiek) tohto lieku (uvedených v

časti 6).

- ak máte závažnú a/alebo nestabilnú astmu alebo sa vám výrazne zhoršila astma počas posledných 3 mesiacov.
- ak lekár určí, že váš úsilný exspiračný objem v jednej sekunde (FEV1) je menej ako 80 %.
- ak máte ochorenie, ktoré ovplyvňuje imunitný systém, užívate lieky na potlačenie imunitného systému alebo máte rakovinu.
- ak máte vredy alebo infekcie v ústnej dutine. Lekár vám môže odporučiť odloženie začiatku liečby alebo jej prerušenie, kym sa vám ústna dutina nezahojí.

Nezačínajte s užívaním ACTAIRU, ak ste tehotná.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ACTAIR, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- Ak máte závažné príznaky alergie, ako napríklad ťažkosti s prehľtaním alebo dýchaním, zmeny hlasu, hypotenziu (nízky krvný tlak) alebo pocit hrče v hrdle. Liečbu okamžite ukončíte a obráťte sa na svojho lekára.
- Ak ste mali v minulosti závažnú alergickú reakciu na liek s alergénovými extraktmi.
- Ak sa vaše príznaky astmy zretel'ne zhoršujú. Liečbu okamžite ukončíte a obráťte sa na svojho lekára.
- Ak máte srdcovocievne ochorenie.
- Ak užívate betablokátor (druh liečiv, ktoré sa často predpisujú na ochorenia srdca a vysoký krvný tlak, ale obsahujú ich aj niektoré očné kvapky a masti).
- Ak sa liečite na depresiu tricyklickými antidepresívmi alebo inhibítormi monoaminoxidázy (MAOI) alebo na Parkinsonovu chorobu inhibítormi katechol-O-metyltransferázy (COMT).
- Ak musíte absolvovať chirurgický zákrok v ústnej dutine alebo extrakciu zuba, musíte dočasne prerušiť liečbu ACTAIROM až do úplného zahojenia.
- Ak u vás pretrváva pálenie záhy alebo ťažkosti s prehľtaním, obráťte sa na svojho lekára.
- Ak máte autoimunitné ochorenie v remisii (vymiznutie príznakov choroby).

Porozprávajte sa so svojím lekárom:

- o všetkých ochoreniach, ktoré ste nedávno prekonali;
- ak ste vy alebo vaša rodina mali v minulosti ochorenie, ktoré by mohlo mať vplyv na váš imunitný systém;
- ak máte alergické ochorenie, ktoré sa v poslednom čase zhoršilo.

Ak užívate lieky na liečbu astmy a/alebo lieky na zmiernenie astmy, neprerušujte vašu liečbu astmy bez odporúčania lekára, pretože príznaky astmy sa môžu zhoršiť.

Počas liečby môžete očakávať mierne až stredne závažné lokalizované alergické reakcie. Ak sú tieto reakcie závažné, porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste zistili, či nepotrebujuete lieky proti alergii, napríklad antihistaminiká.

Deti a dospevajúci

ACTAIR sa používa na liečbu alergickej rinitídy u dospevajúcich (12 – 17 rokov). ACTAIR nie je určený na použitie u detí vo veku do 12 rokov.

Iné lieky a ACTAIR

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate iné lieky na alergiu, napríklad antihistaminiká, lieky na úľavu od astmy alebo steroidy, alebo liek, ktorý blokuje látka nazývanú imunoglobulín E (IgE), napr. omalizumab, porozprávajte sa so svojím lekárom, či máte tieto lieky naďalej užívať. Ak prestanete užívať lieky na alergiu, môže sa u vás počas liečby ACTAIROM prejavíť viac vedľajších účinkov.

ACTAIR a jedlo a nápoje

Päť minút po užíti tohto lieku nekonzumujte jedlo ani nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie sú k dispozícii skúsenosti s používaním ACTAIRU počas tehotenstva. Preto sa počas tehotenstva nemá začínať s liečbou ACTAIROM. Ak počas liečby otehotniete, porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, či je vhodné v liečbe pokračovať.

Nie sú k dispozícii skúsenosti s používaním ACTAIRU v období dojčenia. Nepredpokladajú sa však žiadne účinky na dojčené deti. Porozprávajte sa so svojím lekárom, či môžete v období dojčenia svojho dieťaťa nadálej užívať ACTAIR.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri ACTAIRE neboli pozorované žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

ACTAIR obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať ACTAIR

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečbu ACTAIROM je potrebné začať dávkou 100 IR a dávku postupne zvyšovať až do dosiahnutia udržiavacej dávky 300 IR. IR (index reaktivity) vyjadruje aktivitu. ACTAIR 100 IR je určený len na obdobie zvyšovania dávky, nie na udržiavaciu liečbu.

Odporuča sa užiť prvú dávku pod lekárskym dohľadom. Lekár vás bude informovať o pláne a trvaní zvyšovania dávky.

Použitie u dospelých

U dospelých je dávkovanie rovnaké ako u dospelých.

ACTAIR užívajte nasledovne:

1. Vyberte jednu tabletu (alebo 2 tablety) z balenia, pretlačením tablety cez fóliu.
2. Užívajte tabletu počas dňa, do prázdnych úst.
3. Tabletu vložte pod jazyk a držte ju pod jazykom, kým sa nerozpustí, a potom zvyšok prehltnite.



4. Aspoň 5 minút nejedzte ani nepite.
5. Po manipulácii s tabletou si umyte ruky.

Ak užijete viac ACTAIRU, ako máte

Ak užijete viac ACTAIRU, ako máte, môžu sa u vás prejavíť alergické príznaky vrátane lokalizovaných príznakov v ústach a hrdle. Ak budú príznaky závažné, okamžite vyhľadajte lekára alebo nemocnicu.

Ak zabudnete užiť ACTAIR

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju neskôr počas dňa. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste ACTAIR neužívali viac než 7 dní, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete opäť užívať ACTAIR.

Ak prestanete užívať ACTAIR

Ak nebudete tento liek užívať, ako máte, liečba pre vás nemusí mať priaznivé účinky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov trvá niekoľko minút až hodín po užití lieku a väčšina vymizne po uplynutí 1 až 3 mesiacov liečby.

Prestaňte užívať ACTAIR a okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo nemocnicu, ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov:

- rýchly opuch tváre, ústnej dutiny, hrdla alebo kože
- ťažkosti s prehlitaním
- ťažkosti s dýchaním
- zmeny hlasu
- hypotenzia (nízky krvný tlak)
- pocit plného hrdla (ako opuch)
- žihľavka a svrbenie kože

Možné ďalšie vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- opuch alebo svrbenie v ústach
- podráždenie hrdla
- svrbenie v uchu

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- svrbenie očí
- opuch alebo svrbenie pier alebo jazyka
- pálenie alebo trúpnutie v ústach, zápal a bolest' v ústnej dutine, vred v ústnej dutine
- zmenené vnímanie chuti
- nepríjemný pocit alebo bolest' v ústach a/alebo hrdle
- opuch hrdla, ťažkosti s prehlitaním
- kašeľ
- ťažkosti s dýchaním
- bolest' v hrudi
- bolest' žalúdka, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, hnačka
- svrbenie

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- začervenané a zapálené oči, opuch očí, slzenie
- bolest' alebo trúpnutie ucha
- vertigo, závrat
- bolest' hlavy
- malátnosť alebo únava
- rinitída (kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie nosa, upchatý nos)
- krvácanie z nosa
- prechladnutie
- zápal pier alebo jazyka
- poruchy ústnej dutiny ako pálenie, znížená citlivosť, kandidóza, problémy so slinami
- opuch podnebia
- opuch tváre

- sucho v ústach alebo hrdle, smäd
- pľuzgiere v ústnej dutine a/alebo hrdle, opuch ústnej dutiny a hrdla po konzumácii ovocia alebo zeleniny
- poruchy hrdla ako pálenie/tŕpnutie alebo stiahnutie hrdla, zachrípnutie, pocit hrče v hrdle, neprijemný pocit alebo opuch v zadnej časti hrdla
- astma, dýchavičnosť, sipot
- neprijemný pocit v hrudi
- bolest' v pažeráku, zápal pažeráka alebo žalúdka, pálenie záhy
- vracanie
- gastroenteritída (zápal žalúdka a črev)
- lokalizovaný opuch, opuch pod kožou
- vyrážka, podráždenie kože, žihľavka
- úzkosť
- pocit trúpnutia alebo pichania
- neobvyklé výsledky vyšetrení krvi

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- zápal očného viečka, neobvyklé sťahy očného viečka, podráždenie očí
- upchaté ucho, zvonenie v ušiach
- neprijemný pocit v nose, upchaté prinosové dutiny
- zápal d'asien, krvácanie v ústnej dutine
- zapáchajúci dych, grganie
- bolest' pri prehlitaní
- podráždenie hlasiviek
- rýchle dýchanie
- znecitlivenie hrdla
- sezónna alergia
- bronchitída (zápal priedušiek)
- bolest' prsníka
- búšenie srdca, rýchly tep
- opuch pažeráka
- častá stolica, dráždivé črevo, plynatosť
- podráždenosť, poruchy pozornosti, znížená citlivosť, ospalosť, poruchy reči, trasenie
- pľuzgiere, začervenaná koža, akútne kožné reakcie, svrbiace rany
- neprijemné pocity alebo sťahy svalov
- naliehavá potreba močenia

Ak vás niektorý vedľajší účinok znepokojuje, obráťte sa na svojho lekára, ktorý rozhodne o tom, či na jeho zmiernenie potrebujete nejaké lieky, napríklad antihistamíniká.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ACTAIR

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ACTAIR obsahuje

- Liečivo je štandardizovaný alergénový extrakt z roztočov domáceho prachu z druhov *Dermatophagoides pteronyssinus* a *Dermatophagoides farinae*. Jedna sublingválna tableta obsahuje 100 IR.
- IR (index reactivity) vyjadruje aktivitu.
- Ďalšie zložky sú koloidný, bezvodý oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy, stearát horečnatý, manitol (E 421) a mikrokryštalická celulóza.

Ako vyzerá ACTAIR a obsah balenia

Sublingválna tableta.

Tablety 100 IR sú biele až béžové, okrúhle a obojstranne vypuklé s hnedými škvunami a nápisom „SAC“ vyrytým na jednej strane a číslom „100“ na druhej strane.

Tablety sú dodávané v hliníkových blistroch s odstráiteľnou hliníkovou fóliou vo vonkajšej škatuli.

Veľkosti balenia:

Balenie s 3 sublingválnymi tabletami

Balenie s 15 sublingválnymi tabletami

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

STALLERGENES

6 rue Alexis de Tocqueville

92160 Antony

Francúzsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a v Spojenom kráľovstve (Severnom Írsku) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Actair 100 IR Sublingualtabletten

Belgicko Orylmyte 100 IR comprimés sublinguaux

Bulharsko АКТАИР 100 IR сублингвалини таблетки

Chorvátsko Orylmyte 100 IR sublingvalne tablete

Česká republika, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko ACTAIR

Dánsko, Nórsko, Švédsko Aitmtyte

Francúzsko Orylmyte 100 IR, comprimé sublingual

Nemecko ORYLYMYTE 100 IR

Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) ACTAIR 100 IR sublingual tablets

Taliansko, Luxemburško ORYLYMYTE

Holandsko Actair 100 IR, tabletten voor sublinguaal gebruik

Slovinsko Actair 100 IR podjezične tablete

Slovenská republika ACTAIR 100 IR sublingválne tablety

Španielsko Actair 100 IR comprimidos sublinguales

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 03/2023.