

Písomná informácia pre používateľa

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA koncentrát na infúzny roztok

chlorid draselný

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA
3. Ako používať INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA a na čo sa používa

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA je koncentrát na infúzny roztok. Má vysoký obsah draslíkových (K^+) iónov. Draslík (latinsky „*kalium*“) je základným kationom intracelulárnej tekutiny, ktorý je nevyhnutný pre množstvo fyziologických bunkových pochodov (elektrochemický gradient bunkovej membrány, svalové kontrakcie, vedenie vzruchu neurónom), reguláciu osmotického tlaku a pre normálnu funkciu obličiek.

Používa sa:

- na prevenciu a liečbu nízkej hladiny draslíka v krvi (hypokaliémia), predovšetkým spojenej s hypochloremickou alkalózou (strata chloridových iónov, napr. pri vracaní alebo podávaní diuretík),
- pri zvýšených stratách draslíka pri hnačkových ochoreniach,
- pri nefrotickom syndróme (ochorenie obličiek),
- pri diuretickej liečbe (liečba zvyšujúca tvorbu a vylučovanie moču),
- pri dlhodobej liečbe kortikoidmi (lieky s hormonálnymi účinkami),
- pri ileóznom stave (nepriechodnosti čreva),
- pri hyperaldosteronizme (stav spojený so zvýšenou tvorbou aldosterónu, kedy dochádza k stratám draslíka) a traumách (úrazoch),
- pri iónových rozvratoch akejkolvek inej príčiny.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA vám nesmú podať

- ak ste alergický na chlorid draselný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- pri vzostupe hladiny draslíka v krvi a pri stavoch, ktoré môžu tento vzostup vyvolať (napr. ťažké poranenia, poruchy obličkových funkcií, popáleniny, dehydratácia organizmu (strata vody),

- pri súbežnej liečbe diuretikami šetriacimi draslík (liekmi podporujúca tvorba moču),
- pri silnej hemolýze (rozpad červených krviniek, vstrebávanie rozsiahlych krvných výronov).

Upozornenia a opatrenia

Liek nesmie byť opakovane aplikovaný, je určený na jednorazové použitie.
Neriedený liek sa nesmie aplikovať.

Iné lieky a INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Liek je nutné podávať veľmi opatrne pri súbežnej terapii liekmi, ktoré vedú k zvyšovaniu hladiny draslíka, ako nesteroidné protizápalové látky, beta-blokátory (lieky na liečbu niektorých srdcových ochorení alebo vysokého krvného tlaku), heparín (látka znižujúca zrážanie krvi), digoxín, ACE inhibitory, blokátory účinku aldosterónu (všetko lieky na liečbu vysokého krvného tlaku), diuretiká šetriace draslík.

Ak takéto lieky užívate, bude pravdepodobne potrebné zmeniť dávkovanie.

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA a jedlo a nápoje

Spýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, čo môžete jesť a piť.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako vám podajú tento liek.

Tento liek sa môže podávať tehotným a dojčiacim ženám.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známy vplyv tohto lieku na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

Tento liek vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra vo forme pomalej infúzie do žily. Na základe vášho veku, telesnej hmotnosti, klinického stavu a účelu liečby lekár rozhodne, aké množstvo tohto lieku budete potrebovať, v akej koncentrácii a ako často vám bude podávaný. Tento liek sa zvyčajne podáva do žily na ruke cez plastovú hadičku napojenú na ihlu. Váš lekár môže použiť aj iný spôsob podania.

Tento liek sa podáva vždy v roztoku glukózy alebo fyziologickom roztoku, nikdy nie samostatne. Dávkovanie je individuálne podľa hladiny draslíka v sére, rýchlosťou nepresahujúcou 20 mmol draslíka za hodinu u dospelého pacienta. Koncentrácia draslíka v infúzii nemá presiahnuť 40 mmol/l. Pri parenterálnom podaní sa všeobecne nepodáva viac draslíka než 150 – 200 mmol/deň.

Ak vám podajú viac INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA, ako sa má

Tento liek vám bude podávať zdravotnícky pracovník v zdravotníckom zariadení, preto je predávkovanie veľmi nepravdepodobné.

Pri predávkovaní alebo zistení hyperkaliémie (zvýšené hladiny draslíka v krvi) je nevyhnutné ihneď zastaviť prívod draslíka a jeho nadbytok z organizmu odstrániť (dostatočnou hydratáciou, podaním diuretík s kaliuretickým účinkom, prípadne hemodialýzou či peritoneálnou dialýzou).

Ak sa prestane používať INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

O ukončení podávania tohto lieku rozhodne lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme vedľajšie účinky (častot' sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- pri nadmernom prívode lieku: zvýšená hladina draslíka v krvi (hyperkaliémia), poruchy nervovosvalového vedenia (poruchy citlivosti, ochrnutie, svalová slabosť), poruchy srdcového rytmu s možnosťou zastavenia srdca.

V prípade účinkov poškodzujúcich srdce (kardiotoxických účinkov) sa podáva infúzia kalcium glukonátu za trvalého sledovania EKG.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na vaku po „EXP“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry, ak sú prítomné viditeľné častice alebo je obal lieku poškodený.

Liek nesmie byť opakovane aplikovaný, je určený len na jednorazové použitie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA obsahuje

- Liečivo je chlorid draselný. 1 000 ml koncentrátu na infúzny roztok obsahuje 74,5 g chloridu draselného.
- Pomocná látka je voda na injekcie.

Ako vyzerá INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA a obsah balenia

Číry, bezfarebný roztok bez mechanických nečistôt.

Liek je dodávaný v PP plastových vakoch ENVIBAG s injekčným a infúznym portom:

1 x 100 ml (jednotlivo)

40/50/60 x 100 ml (v škatuli)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2023.