

## Písomná informácia pre používateľa

### Otrivin Complete 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosový roztokový sprej

xylometazolínium-chlorid/ipratropium-bromid

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára.
- Ak sa u vás vyskytne akýkolvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Otrivin Complete a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin Complete
3. Ako používať Otrivin Complete
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Otrivin Complete
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Otrivin Complete a na čo sa používa**

Otrivin Complete je kombinácia 2 rôznych liečiv. Jedno liečivo zmiernuje výtok z nosa a druhé odstraňuje upchatie nosa.

Otrivin Complete sa používa na liečbu upchatého nosa so zvýšeným výtokom (rinorea) pri bežnej nádche.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin Complete**

**Nepoužívajte Otrivin Complete:**

- u detí mladších ako 18 rokov, pretože nie sú k dispozícii dostatočné informácie o bezpečnosti a účinnosti;
- ak ste alergický na xylometazolínium-chlorid, ipratropium-bromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak ste alergický na atropín alebo atropínu podobné látky, napr. hyoscyamín a skopolamín;
- ak vám bola odstránená hypofýza operáciou cez nos;
- ak ste mali operáciu mozgu vykonávanú cez nos alebo ústa;
- ak trpíte glaukom (zvýšený vnútrooočný tlak);
- ak máte veľmi sucho v nose (zápalové sucho v nose, rhinitis sicca alebo atrofická rinitída).

## **Upozornenia a opatrenia**

Otrivin Complete môže spôsobiť poruchy spánku, závraty, tras, nepravidelný srdcový rytmus alebo zvýšený krvný tlak, ak ste citliví na liečivá, ktoré uvoľňujú upchatý nos. Obráťte sa na lekára, ak sa u vás vyskytli niektoré z uvedených príznakov a sú pre vás obťažujúce.

## **Pozorujte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred použitím lieku Otrivin Complete, ak máte:**

- srdcové ochorenie (napr. syndróm dlhého QT intervalu);
- zvýšený krvný tlak;
- cukrovku;
- zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreózu);
- tŕažkosti pri močení a/alebo zväčšenú prostatu;
- glaukom s úzkym uhlom;
- sklon ku krvácaniu z nosa;
- upchatie čreva (paralytický ileus);
- cystickú fibrózu;
- benigny nádor nadobličiek, ktorý produkuje veľké množstvo adrenalínu a noradrenalínu (feochromocytóm), alebo zvláštnu citlivosť na adrenalín a noradrenalín.

Môže sa vyskytnúť okamžitá alergická reakcia. Jej prejavmi sú svrbivé červené vyrážky s vystúpeným zápalom kože (žihľavka), tŕažkosti s dýchaním alebo s rečou, tŕažkosti s prehĺtaním v dôsledku opuchu pier, tváre alebo hrdla. Tieto príznaky sa môžu objaviť jednotlivo alebo v kombinácii ako tŕažká alergická reakcia. Ak k tomu dôjde, ihned prestaňte používať Otrivin Complete (pozri časť 4).

Otrivin Complete sa nemá používať dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich dní. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť upchatie nosa a návrat alebo zhoršenie opuchu nosovej sliznice.

Zabráňte vstreknutiu lieku Otrivin Complete do očí alebo ich okolia. Ak sa Otrivin Complete dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich studenou vodou. Môžete zaznamenať dočasné rozmazané videnie, podráždenie očí, bolest alebo začervenanie očí. Ak sa to stane, kontaktujte svojho lekára. Môže sa tiež vyskytnúť zhoršenie glaukomu s úzkym uhlom.

## **Deti a dospevajúci**

Otrivin Complete sa neodporúča používať u detí a dospevajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným informáciám o bezpečnosti a účinnosti.

## **Používanie iných liekov**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznamte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

### Je zvlášť dôležité, aby ste spomenuli:

- inhibítory monoaminooxidázy (používané pri liečbe depresie): ak užívate alebo ste užívali tieto lieky počas posledných dvoch týždňov, môže dôjsť k nebezpečnému zvýšeniu krvného tlaku;
- tricyklické a tetracyklické antidepresíva: ak užívate alebo ste užívali tieto lieky počas posledných dvoch týždňov, môže dôjsť k nebezpečnému zvýšeniu krvného tlaku;
- lieky používané pri liečbe cestovateľskej nevoľnosti (lieky obsahujúce anticholinergné látky);
- lieky používané pri črevných problémoch (najmä pri abnormálnej motilite) (lieky obsahujúce anticholinergné látky);
- lieky používané pri liečbe porúch dýchania (beta-2-agonisty), ako je astma alebo chronická obstrukčná choroba plúc (CHOPC), pretože môžu zhoršiť váš glaukom, ak máte v anamnéze glaukom s uzavretým uhlom.

Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, obráťte sa pred použitím Otrivinu Complete na lekára.

## **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Otrivin Complete sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

Otrivin Complete sa nemá používať počas dojčenia, pokiaľ vám to neodporučí lekár a rozhodne, že výhody pre vás prevážia možné riziká pre dieťa.

## **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Pri používaní lieku Otrivin Complete boli hlásené poruchy videnia (vrátane rozmazeného videnia a rozšírenia zreníc), závraty a únavu. Ak sa objavia, nesmiete viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo sa zúčastňovať aktivít, pri ktorých tieto príznaky môžu ohrozit vás alebo vaše okolie.

### **3. Ako používať Otrivin Complete**

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### **Odporučaná dávka**

**Dospelí:** 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, maximálne 1 až 3-krát denne po dobu maximálne 7 dní. Medzi dvomi dávkami má uplynúť aspoň 6 hodín. Neprekračujte 3 podania denne do každej nosovej dierky.

Neprekračujte odporúčanú dávku. Používajte najnižšiu možnú dávku, čo najkratšiu dobu, potrebnú na zvládnutie príznakov.

#### Dĺžka liečby:

Nepoužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní.

Ak sa príznaky zmiernia ešte pred uplynutím maximálnej doby liečby 7 dní, odporúča sa liečbu liekom Otrivin Complete ukončiť, aby sa minimalizovalo riziko nežiaducích účinkov.

Ak sa príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia do 7 dní, vyhľadajte lekára.

Ak máte pocit, že účinok lieku Otrivin Complete je prislabý alebo prisilný, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

#### Pumpa ovládaná dvoma prstami zvisle

#### **Pokyny na použitie**

- Odstráňte ochranný kryt.
- Nestrihajte hornú časť trysky. Dávkovací sprej je pripravený na použitie.



- Pred prvým použitím najprv stlačte pumpičku 4-krát. Akonáhle sa pumpička naplní, obvykle vydrží naplnená po celú dobu pravidelného denného používania. V prípade, že sprej nie je vystrekovaný po celú dobu stlačenia alebo ak liek neboli používaný počas 6 dní, musí byť pumpička opäťovne naplnená 4-násobným počtom stlačení ako na začiatku.

1. Vyprázdnite si nos.

2. Fláštičku držte zvislo s tryskou smerujúcou hore s palcom pritlačeným na dno fláštičky a tryskou medzi dvoma prstami.
3. Mierne sa predkloňte a vložte trysku do nosovej dierky.
4. Stlačte jedenkrát pumpu a súčasne jemne vdychujte nosom.
5. Opakujte tento postup aj pri druhej nosovej dierke.
6. Pred nasadením uzáveru, ihned po použití, vyčistite a osušte trysku.

#### Pumpa ovládaná palcom z boku

##### **Pokyny na použitie**

Odstráňte uzáver.

##### **Pred prvým použitím**

Stlačte pumpičku 5-krát, aby došlo k jej naplneniu. Hned' ako sa pumpička naplní, vydrží naplnená po celú dobu pravidelného denného používania.

1. Vyprázdnite si nos.
2. Fláštičku držte zvislo s palcom na spúšťacom tlačidle.
3. Aby nedochádzalo ku kvapkaniu, zostaňte vzpriamene stáť a vložte trysku do nosovej dierky.
4. Stlačte tlačidlo, aby ste striekali a zároveň jemne vdychovali nosom. Opakujte tento postup (krok 2 až 4) aj v druhej nosovej dierke.
5. Po každom použití vyčistite a osušte trysku.
6. Nasadte ochranný uzáver späť, kým nebudeť počut' „cvaknutie“.



V prípade, že sprej nie je vystrekovaný po celú dobu stlačenia alebo v prípade, že liek nebol používaný dlhšie ako 7 dní, musí byť pumpička opäťovne naplnená 2 stlačeniami.

Ak nedôjde k aplikácii celej dávky spreju, dávka by sa nemala opakovať.

Sprej má byť používaný iba jednou osobou, aby sa zabránilo možnému prenosu infekcie. Nestrieckajte liek Otrivin Complete do očí alebo do ich okolia.

Účinok nastupuje v priebehu 5 – 15 minút.

##### **Ak použijete viac Otrivinu Complete, ako máte**

Ak ste vy alebo niekto iný použili väčšie množstvo lieku, ako ste mali, obráťte sa na svojho lekára, nemocnicu alebo pohotovosť kvôli zhodnoteniu závažnosti rizika. Odporuča sa, aby ste mali písomnú informáciu, flášku alebo škatuľku so sebou. Toto je dôležité hlavne u detí, u ktorých sa nežiaduce účinky objavujú s väčšou pravdepodobnosťou ako u dospelých.

Príznaky predávkования sú silné závraty, potenie, výrazné zníženie telesnej teploty, bolesti hlavy, pomalý srdcový tep, rýchly srdcový tep, poruchy dýchania, kóma, krč, vysoký krvný tlak, ktorý môže byť nasledovaný nízkym krvným tlakom. Ďalšie príznaky môžu byť sucho v ústach, ťažkosti s neostrým videním a halucinácie.

V prípade predávkowania kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum (+421 2 54 774 166 alebo +421 911 166 066, [www.ntic.sk](http://www.ntic.sk), [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)).

##### **Ak ste zabudli použiť Otrivin Complete**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

#### 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

**Prestaňte používať Otrivin Complete a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:**

- známky alergickej reakcie ako problémy s dýchaním, rozprávaním alebo prehítaním, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, silné svrbenie kože s červenou vyrážkou alebo pľuzgiere (častosť na nedá odhadnúť z dostupných údajov);
- poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia, zhoršenia glaukomu alebo zvýšenia vnútročného tlaku);
- vidíte dúhové kruhy / okolo jasného svetla a /alebo máte silnú bolest' očí (častosť na nedá odhadnúť z dostupných údajov).

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú krvácanie z nosa a sucho v nose. Mnohé z hlásených nežiaducích účinkov sú tiež príznaky bežného prechladnutia.

**Veľmi časté nežiaduce účinky** (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- krvácanie z nosa.

**Časté nežiaduce účinky** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- diskomfort v nose, upchatý nos, suchý nos, bolest' v nose;
- sucho v ústach, suché alebo podráždené hrdlo;
- zmeny vnímania chuti, bolest' hlavy, závraty, pálenie v mieste aplikácie;
- nevoľnosť.

**Menej časté** (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- vred v nose, kýchanie, bolest' hrdla, kašeľ, chrapot, žalúdočné ťažkosti, zmeny čuchu, tras;
- neprijemný pocit, vyčerpanosť, nespavosť;
- podráždenie očí, suché oči, opuch očí, začervenanie očí;
- palpitácie, zvýšená srdcová frekvencia.

**Zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- výtok z nosa (vodnatá nádcha).

**Veľmi zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- reakcie na liek ako je opuch, vyrážka, svrbenie;
- zhoršené videnie.

**Neznáme** (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

- žihľavka;
- neprijemný pocit v okolí nosa;
- problémy s prehítaním;
- neprijemný pocit na hrudi, smäď;
- náhle kŕče svalov krku, opuch hrdla;
- nepravidelný srdcový tep;
- ťažkosti s akomodáciou oka, rozšírenie zreníc, záblesky, zvýšený vnútročný tlak, glaukom, rozmazané videnie, žiara okolo svetelných zdrojov a bolest' oka;
- ťažkosti s vyprázdením močového mechúra.

Aby sa znížilo riziko nežiaducích účinkov, odporúča sa ukončiť liečbu liekom Otrivin Complete hneď ako sa vaše príznaky zlepšia.

## Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## 5. Ako uchovávať Otrivin Complete

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Tento dátum platí aj vtedy, keď je už fľaška otvorená.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo Otrivin Complete obsahuje

- Liečivá sú xylometazolínium-chlorid a ipratropium-bromid. 1 ml obsahuje 0,5 mg xylometazolínium-chloridu a 0,6 mg ipratropium-bromidu. 1 vstrek obsahuje 70 mikrogramov xylometazolínium-chloridu a 84 mikrogramov ipratropium-bromidu.
- Ďalšie zložky sú edetan disodný, glycerol (85 %), čistená voda, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).

### Ako Otrivin Complete vyzerá a obsah balenia

Otrivin Complete je číry roztok.

Fľaška obsahuje približne 70 vstrekov.

#### Pumpa ovládaná dvoma prstami zvisle

Otrivin Complete je dostupný ako 10 ml nosový roztokový sprej s dávkovacou pumpičkou.

#### Pumpa ovládaná palcom zboku

Otrivin Complete je dostupný ako 10 ml nosový roztokový sprej s dávkovacou pumpičkou ovládanou palcom zboku (s bezpečnostným uzáverom).

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

#### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

e-mail: [mystory.cz@haleon.com](mailto:mystory.cz@haleon.com)

#### Výrobca (Výrobcovia)

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstrasse 4

80339 Mníchov

Nemecko

Haleon Germany GmbH

Barthstrasse 4

80339 Mníchov

Nemecko

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH  
Bahnhofbichl 13  
6391 Fieberbrunn  
Rakúsko

Haleon Denmark ApS  
Delta Park 37  
2665 Vallensbæk Strand  
Dánsko

Haleon Belgium n.v./s.a.  
Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6  
1300 Wavre  
Belgicko

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Belgicko:                       | Otrivine Duo 0,5mg/ml + 0,6mg/ml solution pour pulvérisation nasale                                 |
| Cyprus:                         | Otrivin Advance (0,5mg/ml + 0,6mg/ml) nasal spray solution  |
| Česká republika:                | Otrivin Rhinostop   |
| Dánsko:                         | Otrivin Comp næsespray, oplosning   |
| Estónsko:                       | Otrivin Total   |
| Fínsko:                         | Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nenäsumute, liuos  |
| Grécko:                         | Otrivin Advance 0,5mg/ml + 0,6mg/ml Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα  |
| Maďarsko:                       | Otrivin Komplex 0,5mg/ml + 0,6mg/ml oldatos orrspray  |
| Island:                         | Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nefúði lausn   |
| Írsko:                          | Otrivine Extra Dual Relief 0,5mg/ml + 0,6mg/ml Nasal Spray  |
| Lotyšsko:                       | Otrivin Total 0,5 mg/ml + 0,6mg/ml deguna aerosols, šķīdums   |
| Litva:                          | OtriDuo 0,5 mg/0,6 mg/ml nosies purškalas, tirpalas   |
| Luxembursko:                    | Otrivine Duo 0,5mg/ml + 0,6mg/ml solution pour pulvérisation nasale                                 |
| Malta:                          | Otrivine Extra Dual Relief 0,5mg/ml + 0,6mg/ml Nasal Spray  |
| Holandsko:                      | Otrivin Duo Xylometazoline hydrochloride & Ipratropium bromide, 0,5/0,6 mg/ml, neusspray, oplossing |
| Nórsko:                         | Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nesespray, oppløsning  |
| Poľsko:                         | Otrivin Ipra MAX  |
| Portugalsko:                    | Vibrocil ActilongDuo 0,5mg/ml + 0,6mg/ml soluçao para pulverizaçao nasal                            |
| Rakúsko:                        | Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml Nasenspray, Lösung  |
| Rumunsko:                       | Vibrocil Duo 0,5mg/ml + 0,6mg/ml spray nazal, solutie   |
| Slovenská republika:            | Otrivin Complete  |
| Slovinsko:                      | Otrivin Duo 0,5 mg/0,6 mg v 1 ml pršilo za nos, raztopina   |
| Taliensko:                      | RINAZINA DOPPIA AZIONE 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione                                |
| Španielsko:                     | Rhinovín Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml solución para pulverización nasal                                |
| Švédsko:                        | Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nässpray lösning   |
| Veľká Británia (Severné Írsko): | Otrivine Extra Dual Relief 0,5mg/ml + 0,6mg/ml Nasal Spray  |

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2023.**