

Písomná informácia pre používateľa

Panadol 1 g
filmom obalené tablety

paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečíitali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Panadol 1 g a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol 1 g
3. Ako užívať Panadol 1 g
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Panadol 1 g
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Panadol 1 g a na čo sa používa

Panadol 1 g obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti aj horúčke. Panadol 1 g tablety sú určené na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov, reumatických a svalových bolestiach a bolestiach pri menštruácii. Panadol 1 g tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky, prechladnutia, bolesti v hrdle a znižuje horúčku.

Panadol 1 g sa tiež užíva na liečbu miernej a strednej bolesti spojenej s osteoartritídou (zápalové ochorenie klíbov).

Panadol 1 g je vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol 1 g

Neužívajte Panadol 1 g

- ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte žltáčku, ťažké zlyhávanie pečene a pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Panadol 1 g, obráťte sa na svojho lekára:

- ak trpíte zmenami funkcie pečene;
- ak dlhodobo užívate vyššie dávky Panadolu 1g je nutná pravidelná kontrola funkcie pečene. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.
- Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene paracetamolom.
- Paracetamol sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s vrozeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách a u pacientov s poškodením

funkcie obličiek, ktorí môžu užívať liek len na odporučenie lekára, pretože je u nich nevyhnutné, aby užívali nižšie dávky.

Vzhľadom na množstvo liečiva v lieku nie je Panadol 1 g vhodný pre deti do 12 rokov.

Iné lieky a Panadol 1 g

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase uživali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky lieku Panadol 1 g a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré súbežne užívate alebo ktoré začnete užívať a to na lekársky predpis alebo bez neho.

Skôr ako začnete súbežne s užívaním lieku Panadol 1 g užívať nejaký voľne predajný liek, porad'te sa so svojím ošetroujúcim lekárom.

Súbežné dlhodobé užívanie lieku Panadol 1 g a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek. Súbežné užívanie Panadolu 1 g a pitie alkoholických nápojov môže spôsobiť poškodenie funkcie pečene. Neužívajte súbežne iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol. Rýchlosť vstrebávania paracetamolu sa môže zvýšiť metoklopramidom alebo domperidónom a znížiť cholestyramínom. Dlhodobé užívanie vyšších dávok paracetamolu môže zvýšiť účinok liekov typu warfarínu pôsobiacich proti zrážaniu krvi. Občasné užívanie nemá významný účinok. Paracetamol sa nemá kombinovať s látkami poškodzujúcimi pečeň (niektoré lieky, alkohol). Niektoré látky zvyšujúce činnosť oxidačných enzymov v pečeni (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu.

Panadol 1 g a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby sa nesmie požívať alkohol. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia funkcie pečene. Ak máte problémy s alkoholom, pred začiatkom liečby sa porad'te s lekárom.

Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy môžu liek užívať len po porade s lekárom alebo lekárnikom. Počas dojčenia je možné liek užívať jeden deň, ďalej len po porade s lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek Panadol 1 g nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Panadol 1 g

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek je určený na vnútorné použitie.

Dospelí a mladiství od 15 rokov: 1 tableta podľa potreby 1 až 4-krát denne. Jednotlivé dávky opakujte najskôr po 4 hodinách. **Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Neužívajte viac ako 4 tablety počas 24 hodín.**

Deti 12 – 15 rokov: Pol tablety 1 až 3-krát denne s odstupom najmenej 6 hodín. **Najvyššia jednotlivá dávka je pol tablety. Nepodávajte viac ako 1 a pol tablety počas 24 hodín.**

Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Liek nie je určený deťom mladším ako 12 rokov.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek určí dávkovanie lekár.

Upozornenie: Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viest' k riziku závažného poškodenia funkcie pečene. Tento liek neužívajte bez odporučenia lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu a/alebo máte ochorenie pečene a/alebo užívate akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol. Ak nedôjde pri liečbe liekom Panadol 1 g do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak tŕažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky či neobvyklé reakcie, porad'te sa o ďalšej liečbe s lekárom. Tento liek užívajte bez porady s lekárom najviac 7 dní, deti 3 dni. Počas liečby nepite alkoholické nápoje.

Ak užijete viac Panadolu 1 g, ako máte

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie, ktoré sa môže prejaviť pocitom na vracanie, vracaním a bledosťou alebo po náhodnom požití tablet dieťaťom ihned' vyhľadajte lekára, aj keď nemožno pozorovať žiadne príznaky. Môže dôjsť k zlyhaniu funkcie pečene.

Ak zabudnete užiť Panadol 1 g

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite zvyčajnú dávku lieku hned', ako si na to spomeniete a prípadnú ďalšiu dávku užite s časovým odstupom uvedeným v časti 3. vyššie.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa liek užíva v odporučených dávkach zvyčajne je dobre znášaný, ale môžu sa vyskytnúť kožné vyrážky, dýchavičnosť alebo poruchy krvotvorby. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné tŕažkosti typu tlaku a bolesti žalúdka.

Prestaňte liek užívať a informujte ihned' svojho lekára, ak sa u vás objavia nasledujúce tŕažkosti:

- **Alergické reakcie**, ktoré môžu byť závažné, vrátane kožnej vyrážky, svrbenia, niekedy s opuchom pier, jazyka, hrdla alebo tváre alebo dýchacie tŕažkosti.
- **Kožné vyrážky alebo odlupovanie kože alebo vriedky v ústach.**
- **Problémy s dýchaním.** Pravdepodobnosť výskytu týchto vedľajších účinkov je vyššie, ak ste problémy s dýchaním mali už skôr po užíti iných liekov proti bolesti (napr. ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová).
- Nezvyčajná **tvorba modrín alebo krvácanie**.

Tieto účinky sa budú pravdepodobne vyskytovať len zriedkavo.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotní sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Panadol 1g

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol 1 g obsahuje

- Liečivo je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 1 000 mg paracetamolu.
- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, sorbát draselný, mastenec, kyselina stearová, povidón 25, škrob predželatínovaný, hypromelóza, triacetín.

Ako vyzerá Panadol 1 g a obsah balenia

Panadol 1 g sú biele oválne filmom obalené tablety s plochými hranami s deliacou ryhou na obidvoch stranách, na jednej strane vyrazené PAN 1G.

Veľkosť balenia: 20, 50 alebo 100 tablet v bielej nepriehľadnej HDPE fl'aši zaistenej Al fóliou, s bielym nepriehľadným skrutkovacím uzáverom HDPE/PP s vložkou alebo s bezpečnostným uzáverom „Clik Lok“ v papierovej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcu

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Haleon Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Česká republika

e-mail: mystory.cz@haleon.com

Výrobcu

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Írsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v decembri 2023.