

20 jún 2016

## **Thalidomide Celgene®: Nové dôležité odporúčania týkajúce sa vírusovej reaktivácie a plúcnej hypertenzie**

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

spoločnosť Celgene, po dohode s Európskou liekovou agentúrou a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, by Vás rada informovala o nasledujúcim:

### **Súhrn**

#### **Vírusová reaktivácia**

- Po liečbe talidomidom boli hlásené prípady vírusovej reaktivácie, niektoré závažné, konkrétnie u pacientov, ktorí boli predtým infikovaní vírusom herpes zoster alebo vírusom hepatitídy B (HBV).
- Niektoré prípady reaktivácie herpes zoster vyústili do diseminovaného herpes zoster, vyžadujúceho antivírusovú liečbu a dočasné prerušenie liečby talidomidom.
- Niektoré prípady reaktivácie HBV progredovali do akútneho zlyhania pečene a viedli k ukončeniu liečby talidomidom.
- Pred začatím liečby talidomidom má byť stanovený status vírusu hepatitídy B.
- Pacientom, ktorí sú pozitívni na infekciu HBV, sa odporúča konzultácia u lekára so skúsenosťami s liečbou hepatitídy B.
- Pacienti s predchádzajúcou infekciou majú byť počas liečby pozorne sledovaní pre prejavy a príznaky vírusovej reaktivácie v priebehu terapie, vrátane aktívnej HBV infekcie.

#### **Plúcna hypertenzia**

- Po liečbe talidomidom boli hlásené prípady plúcnej hypertenzie, niektoré fatálne.
- Pred začatím a počas liečby talidomidom sa majú u pacientov zhodnotiť prejavy a príznaky základného kardiopulmonálneho ochorenia.

#### ***Základné informácie o bezpečnosti***

Thalidomide Celgene v kombinácii s melfalánom a prednízónom je indikovaný ako liečba prvej línie pre pacientov s neliečeným mnohopočetným myelómom vo veku  $\geq 65$  rokov alebo pacientov, pre ktorých nie je vhodná vysokodávkovaná chemoterapia.

Vírusová reaktivácia, vrátane vírusu herpes zoster a hepatitídy B, bola hlásená u pacientov užívajúcich talidomid po uvedení lieku na trh. Niektoré prípady reaktivácie vírusu hepatitídy B progredovali do zlyhania pečene. Vírusová reaktivácia herpes zoster vyústila v niektorých prípadoch do diseminovaného herpes zoster, vyžadujúceho antivírusovú liečbu a dočasné prerušenie liečby talidomidom. Pacienti liečení talidomidom majú zvyčajne už existujúce rizikové faktory pre vírusovú reaktiváciu, vrátane vysokého veku a progredujúceho mnohopočetného myelómu. Imunosupresívny účinok talidomidu však môže ďalej zvýšiť riziko vírusovej reaktivácie u pacientov s predchádzajúcou infekciou. Pacienti s predchádzajúcou infekciou majú byť počas liečby pozorne sledovaní pre prejavy a príznaky vírusovej reaktivácie, vrátane aktívnej HBV infekcie.

Prípady pľúcnej hypertenzie, niektoré fatálne, boli tiež hlásené u pacientov užívajúcich talidomid po uvedení lieku na trh. Pred začatím liečby a počas liečby talidomidom sa majú u pacientov zhodnotiť prejavy a príznaky základného kardiopulmonálneho ochorenia.

### ***Výzva na hlásenie podozrenia na nežiaducu reakciu***

Nezabudnite, prosím, že podozrenia na nežiaduce reakcie súvisiace s užívaním lieku **Thalidomide Celgene** sa majú hlásiť v súlade s národnými požiadavkami pre spontánne hlásenie nežiaducích účinkov.

<b>Celgene, s.r.o.</b> Prievozská 4B 821 09 Bratislava Tel: + 421 2 32 638 002 Fax: + 421 2 32 784 000 email: <a href="mailto:drugsafetyslovakia@celgene.com">drugsafetyslovakia@celgene.com</a>	<b>Štátny ústav pre kontrolu liečiv</b> Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 tel: 02 507 01 206 fax: 02 507 01 237 email: <a href="mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk">neziaduce.ucinky@sukl.sk</a> webový formulár: <a href="https://portal.sukl.sk/eskadra/">https://portal.sukl.sk/eskadra/</a>
---	---

### ***Komunikácia***

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, zástupcu spoločnosti Celgene na nižšie uvedenej adrese.

S pozdravom

MUDr. Ivan Čurek  
Country Manager

**Celgene, s.r.o.**  
Prievozská 4B  
821 09 Bratislava  
Tel: + 421 2 32 638 002  
Fax: + 421 2 32 784 000